

2歳8か月児健康診査の聴力検査について

2歳8か月児健診を受ける前に・・・

中等度難聴の早期発見のために、自宅でささやき声検査（聴覚自己検査）を行いましょ
う。その結果（23ページ）を健診日にお持ちください。

中等度難聴とは？

中等度難聴は、音は聞こえていますが、普通の声の大きさの会話を聞き間違えたり、聞き
取りにくかったりするため、発見が遅れることがあります。難聴に気づかずに生活を続け
ると、言語発達や学習やコミュニケーションの場面において影響を及ぼす場合があります。

大切なお子さんの健やかな成長発達のためにささやき声検査とアンケートのご記入をお願
いします。

ささやき声検査（聴覚自己検査）の方法について

- ① 室内のテレビなどは消し、室内ができるだけ静かな時に行います。
強い雨の日などは避けましょう。（戸外を走る車の音で聞こえづらくなることもあります。）
- ② 絵を子どもの方向に向けて置き、1mくらい離れて向かい合って座ります。
＊向かい合って行にくい場合は、保護者の膝の上にお子さんを座らせて行ってもよいです。
- ③ 「この絵の中の名前を言うから、ぴったりの絵を指さしてね」と子どもに言って、まず普
通の声（会話をする時の声）で、絵シート（22ページ）の表示した絵の名前を言い、子ども
が6個の絵をすべて正しく指さしできるように練習します。
- ④ 「今度は小さな声で絵の名前を言うから、よく聞いて指さしてね」と子どもに言って、保
護者の口もとを見せないように手や紙などで隠して、6個の絵の名前をささやき声で1回ず
つ言います。正しく指さしできれば表に○を、正しく指さしできなければ×を記入します。





* 検査の注意事項

絵の名前を言うのは1回だけです。聞き返されても繰り返し言わないでください。
また、ささやき声が大きくならないように注意してください。

* “ささやき声” の出し方

ささやき声は息を出すだけの感じで、ないしょ話のようにささやきます。普通の声はのど（の
どぼとけ）に手をあてた時、指に振動が感じられますが、ないしょ話のようにささやくと振動
は感じません。この状態が“ささやき声”です。

ささやき声検査用絵シート



ささやき声検査結果票

※この用紙を健診当日お持ちください。

お子さんのお名前 _____ 生年月日 _____ 年 月 日

I ささやき声検査（聴覚自己検査）の結果 実施日 _____ 月 _____ 日

実施された方はどなたですか。 父・母・祖父・祖母・その他（ _____ ）

正しく指さしができたものに○、できなかったものに×を記入してください。

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| いぬ | くつ | かさ | そう | ねこ | いす |
| | | | | | |

II お子さんの耳に関するアンケート

お子さんについて当てはまるところを○で囲んでください。

| 質 問 | | |
|--|-----|----|
| 1、家族、親類の方に、小さい時から耳の聞こえにくい方・聞こえない方がいますか。 | いいえ | はい |
| 2、中耳炎に何回か、かかったことがありますか。 | いいえ | はい |
| 3、ふだん鼻づまり・鼻汁をだす・口で息をしている、のいずれかがありますか。 | いいえ | はい |
| 4、呼んで返事をしなかったり、聞き返したり、テレビの音を大きくするなど、聞こえにくいと思うときがありますか。 | いいえ | はい |
| 5、園の保育士など、お子さんに接する人から、聞こえにくいと言われたことがありますか。 | いいえ | はい |
| 6、話しことばについて、遅れている、発音がおかしいなど、気になることがありますか。 | いいえ | はい |
| 7、あなたの言うことばの意味が、動作などを加えないと伝わらないことがありますか。 | いいえ | はい |

※ 結果により医療機関での精密検査が必要になった場合は、乳幼児健診の結果を医療機関へ提供することに同意します。

保護者名 _____

保健師記入欄

| |
|-------------|
| 県総受診歴 有 ・ 無 |
|-------------|

